

Verantwoord antibioticumgebruik bij de keizersnede van het rund



De noodzaak van een profylactische antibioticumbehandeling bij de keizersnede van het rund moet steeds door de dierenarts worden beoordeeld en mag nooit in de plaats komen van de preventieve basismaatregelen.



Zonder peroperatieve complicaties:

Als de dierenarts het nodig acht om profylactisch antibiotica te gebruiken, wordt het gebruik van **procaïne benzylpenicilline als 1ste keuzemiddel** aanbevolen.

- toe te dienen via **intramusculaire weg**
- **bij de start van de voorbereidingsfase (van zodra de dierenarts ter plaatse aankomt), bij voorkeur 15 tot 60 minuten voor de start van de operatie**



Met peroperatieve complicaties:

Wanneer er complicaties optreden, is er geen enkel antibioticum dat als eerste keuze kan worden aanbevolen. **Wanneer er complicaties optreden, beslist de dierenarts geval per geval welk antibioticum hij kiest.** Hij houdt daarbij rekening met specifieke risicofactoren.

Bovenstaande aanbevelingen moeten gezien worden als tijdelijk en gebaseerd op de huidige (beperkte) wetenschappelijke argumenten. **De experts die samen met AMCRA deze richtlijnen hebben opgesteld bevelen klinische studies aan, uitgevoerd in praktijkomstandigheden in België, om op basis hiervan meer “evidence-based” richtlijnen te kunnen formuleren.**

Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen dankzij de samenwerking met dierenartsen van VeDa, UPV en wetenschappers van de faculteiten diergeneeskunde UGent en ULiège.